

HASTA UNA NIÑA DE 12 ESTÁ CONTAGIADA

INFIERNO EN PARAÍSO

IRERA

ssandi@lateja.co.cr

de sífilis, gonorrea o papiloma humano tiene con la peluca parada a las autoridades de Salud de Paraíso de Cartago.

Aunque no califican la situación como un brote o epidemia, desde que se inició el año se ha dado un aumento de estas enfermedades de transmisión sexual (ETS) y, para peores, tienen reportado el caso de una menor de 12 años que se contagió del virus del papiloma humano por tener relaciones sin protección.

La viceministra de Salud, Ana Morice, está alarmada porque la edad promedio para que aparezca esta enfermedad es 15 años.

Los afectados en Paraíso tienen entre 12 y 41 años (6 mujeres y 5 hombres) pero la mayoría de ellos están entre 25 y 29 años. Seis con sífilis, tres con gonorrea y dos con papiloma.

El foco del problema está en la comunidad Llanos de Santa Lucía, aseguró Salud.

Mucho ojo. La gonorrea se detecta en los hombres por dolor al orinar. En las mujeres descubrirla es más difícil; aunque en ambos casos se presenta una secreción amarillenta con un olor fuerte.

La sífilis causa úlceras que no duelen, se les llama también chancros. Aparecen de dos o tres semanas luego del contagio. Si no se recibe tratamiento, un porcentaje de los pacientes luego sufre erupciones en la piel, sobre todo en manos y pies; además, lesiones en boca, vagina y pene, así como fiebre y pérdida de apetito.

El virus del papiloma produce verrugas e infecciones genitales.


Atención. La directora del Área de Salud de Paraíso, Yolanda González, dijo que todos los casos están en tratamiento.

También se trabaja en informar a las parejas para que se examinen a tiempo.

El condón es indispensable para prevenir el contagio. ARCHIVO



Casos del brote según sexo



PROTÉJASE

Lo más importante para que no se contagie de una enfermedad de transmisión sexual es conocer bien a la pareja y su situación actual, es decir, que estén sanos.

Un valor importante es la fidelidad. Muchas veces las enfermedades se pasan por relaciones fuera de la pareja.

Los encuentros ocasionales con personas poco confiables

aumenta el nivel de contagio. **En caso de tener** relaciones sexuales lo recomendable es usar condón.

Lo mejor es revisarse con regularidad o en caso de detectar algún síntoma anormal acudir al médico de manera inmediata.

Los grupos de riesgo son los trabajadores del sexo y homosexuales, estos deben estar en cuidado constante.