

Muchas posibilidades de que la haya contagiado

# Nica con SIDA violó excuñada

♦ **ROBERTO ACOSTA D.**  
racosta@lateja.co.cr

**Un nicaragüense**, de apellido Pérez Venegas, fue detenido después de, presuntamente violar a su excuñada de 19 años, en el barrio La Esperanza de la Rita de Pococí.

Al parecer, el sospechoso amenazó a la muchacha con un cuchillo y abuso de ella.

Lo más triste del caso es que el propio sospechoso confesó a las autoridades que desde hace tres años tiene SIDA.

“Es un 99,9% seguro que la muchacha contrajo la enfermedad”, comentó Carlos Alfaro, presidente del movimiento contra el VIH.

En Costa Rica, nunca se ha presentado alguna denuncia en la que alguien haya sido infectado a propósito por otra persona.

“Se han dado casos, pero la gente prefiere guardar silencio por miedo o vergüenza”, dijo Alfaro.

Si las autoridades confirman



ARCHIVO GN

**En la Rita de Pococí se dio la violación de la joven de 19 años.**

que Pérez contagió a su excuñada con el SIDA podría ir de 3 a 16 años a la cárcel, sin contar el delito de violación.

Sin embargo, esta situación no podrá saberse pronto pues existe un período de incubación que varía de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona y puede ser de 7 a 9 meses.

## LO MEJOR ES EL CONDÓN

El uso del preservativo no sólo evita los embarazos no deseados sino que protege a las personas de la transmisión de enfermedades. Sin embargo, es importante saber cómo ponerlo, evitar que entre aire pues esto podría provocar que se rompa.



## EL 1, 2, 3

CARLOS ALFARO, PRESIDENTE  
MOVIMIENTO CONTRA EL SIDA

**1 ¿Un hombre infectado puede contagiar una mujer con sólo una relación sexual?**

Cualquier práctica sexual sin protección implica riesgo y alta probabilidad de contagio.

**2 ¿Cuánto tiempo tiene que esperarse para hacerse la prueba?**

No se recomienda que vaya al día siguiente a hacerse la prueba. Es mejor

esperar unos 6 u 8 meses para hacer la prueba, pero en ese tiempo no podrá tener relaciones sexuales sin protección.

**3 ¿Cómo se contagia el SIDA en la relación sexual?**

En cualquier relación sexual hay ruptura de tejidos y vasos capilares y el hombre en su semen lleva el virus que se infiltra en las pequeñas fisuras que se pueden provocar.