

COMO INSTRUMENTO DE CONTROL DEM

En todas las culturas y en todos los tiempos la gente ha aplicado métodos para controlar su fecundidad. Recién desde hace algunas décadas, la ciencia médica occidental también se ha empeñado en el descubrimiento de medios anticonceptivos. Estos descubrimientos traen consigo el rechazo de los métodos tradicionales como: estúpidos, crueles o simplemente sin sentido, con el resultado de que estos métodos prácticamente ya no se usan en ninguna parte. (Recientemente se ha retomado la investigación sobre medios tradicionales, naturales y no dañinos de control de la natalidad, por el Centro de Salud Femenino, en Ginebra y Estados Unidos).

La investigación médica sobre medios anticonceptivos ha puesto especialmente el acento en las variedades de la "píldora" y diversos medios inyectivos, y en la disminución de los riesgos de aborto y esterilización. Muy poca o ninguna atención se ha prestado al perfeccionamiento del pesario o condón, desde los años 50, medios que son inofensivos para el cuerpo humano (e incluso ofrecen cierta protección contra enfermedades contagiosas).

La divulgación de los medios y conocimientos desarrollados en el Occidente a través de todo el mundo, especialmente por medio de los programas del "family planning" ha conducido a:

- En este momento se esterilizan 80 millones de personas al año (sobretudo mujeres, las cuales corren un mayor riesgo que los hombres en este aspecto);
- la "píldora" es consumida por 55 millones de mujeres;
- aproximadamente 55 millones de mujeres abortan anualmente, de las cuales la mitad lo hace ilegítimamente. Abortos ilegales y peligrosos causan la muerte de 55 a 100 mujeres de cada 100.000. En las áreas donde hay escasa atención médica, la mortalidad es mucho mayor, es decir 1 de cada 100(1). El IPPF hace el cálculo, que de 16 millones de abortos ilegales, 1 de cada 200 intentos, conduce a la muerte de la mujer. Un aborto ilegal, no sólo puede conducir a la muerte, sino también puede traer graves consecuencias. En Turquía y Venezuela, un 60% de las camas de la sección femenina de los hospitales urbanos y un 40 a 50% de la cantidad de sangre disponible son necesarias para las mujeres que sufren las consecuencias de un aborto ilegal (2). Se calcula, que (en todo el mundo) 5 a 15 de 1.000 mujeres que son hospitalizadas a causa de un aborto ilegal, pierden la vida;
- como cuarto en la lista de anticonceptivos, sobresale el espiral.

