Navégalo Data Center
Eleve su negocio con infraestructura tecnológica avanzada.
navēgalo
Conozca más

INICIO
ÚLTIMA HORA
PÁGINA 2
NACIONALES
LO MÁS LEÍDO
ESTILO EJECUTIVO
ACCIÓN
OPINIÓN
SOSTENIBILIDAD
MÁS

IMPULSO PYME
PRO SAN JOSÉ
BBC NEWS MUNDO
NOTA DE TANO
MUJER EMPRENDEDORA
FORO DE LOS LECTORES
IMPUESTOS Y SU DINERO
RANKING
ESPECIALES Y SUPLEMENTOS
FORBES CENTROAMÉRICA
NEWSLETTERS
CONTENIDOS EXCLUSIVOS
BICENTENARIO CR
BLOGS
VIDEOS

Estudiar tu Ingeniería favorita es creer en vos

Lesiones avanzadas son cada vez más frecuentes

Falta de educación y medicina preventiva afectan detección temprana del papiloma humano

Uno de cada 20 casos de cáncer en el mundo se debe a la infección por este virus

Jéssica Salazar
jessicasalazar.asesora@larepublica.net |
Martes 08 febrero, 2022



En Costa Rica se reporta una prevalencia del Virus del Papiloma Humano en el 22.4% de las

13:15
Gabriela Traña obtiene título del Comité Olímpico Internaci como nutricion deportiva

13:00
¡Orgullo! Delegaci tica en Olimpiad Centroan de Química gana 4 medallas

12:30
(Video) ¿Cómo le beneficia la nueva metodolo para calcular tarifas eléctricas Le explicam en 3 puntos

mujeres que se realizan una citología normal.
Shutterstock/La República

La aparición de lesiones benignas, premalignas y malignas en el tracto anogenital, asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH) son cada día más frecuentes, tanto en mujeres, como en hombres y a edades tempranas.

Así lo aseguran médicos consultados por LA REPÚBLICA, quienes indican que ahora, la aparición de estas se presenta mayormente al final de la adolescencia y a inicios de la segunda década.

Lea más: Más de 21 mil niñas tienen pendiente segunda dosis contra el papiloma humano

“El papiloma humano es el virus de transmisión sexual más frecuente en el mundo, que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque claramente la incidencia de este es mayor en la población femenina”, recalca Mauricio Aburto, médico ginecólogo de MediSmart.

12:15
Turistas de 60 países podrán permane ahora en el país hasta 180 días

11:45
Tico José Pablo Gil participó en el US OPEN como entrenad

MÁS LEÍDAS

DÍA 7 DÍAS 30 DÍAS

Cuidar el turismo es clave para impulsar

Hay más de 200 tipos de este virus, pero alrededor de 40 son los que afectan el área genital de la persona, esto incluye vulva, vagina, ano, pene y escroto.

Asimismo, se dividen en dos tipos: de bajo riesgo, que son los que causan las verrugas genitales y los de alto riesgo que son los que producen cáncer, señala Stephania Ortega, médico de Clínica sin Fronteras.

En Costa Rica se reporta una prevalencia del Virus del Papiloma Humano en el 22.4% de las mujeres que se realizan una citología normal; de estas el 72.9% hace referencia a lesiones de grado leve, el 89.8% corresponden a lesiones de alto grado y, el 97.1% en aquellas que presentan cáncer cervical, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

.Y es en este sentido que los especialistas señalan la importancia de las revisiones regulares, ya que la detección médica se está dando cuando ya hay lesiones de mayor complejidad.

la economí costarric del futuro

El Potencia de Blockcha en la era digital

3 doctores costarric brillan por sus aportes en el escenari global de la medicin

La responsa de las empresa en la etapa de ebullició global: Hacia una producci sostenib

“El principal síntoma ya de una enfermedad avanzada o de un cáncer que nos puede encender las alertas son dolores durante una relación sexual, sangrado post coital y la aparición de llagas. La mayoría de lesiones premalignas que se pueden tratar son aquellas que no generan ningún síntoma”; explica Vivían Kellermann, médico ginecóloga del Hospital Metropolitano.

Lea más: Estudio tico busca probar eficacia de una sola dosis de vacuna contra el Papiloma Humano

El virus puede ser latente, es decir estar ahí y no producir lesión, pero también puede ser activo y causar lesiones genitales, las cuales se manifiestan como verrugas, y ya, en un estado avanzado convertirse en un cáncer, indica Leonel Abud médico ginecólogo, del Hospital Clínica Bíblica, quien también señaló que la activación del mismo va a depender mucho del sistema inmunológico de las personas.

El virus puede desarrollarse en cualquier persona, por lo que son

BAC relanza tarjeta de crédito para pequeña y mediana empresa con bajo interés

importantes las pruebas de tamizaje que se hacen en general a toda la población.

“Podemos hablar de una parte preventiva que va relacionada directamente con el buen estilo de vida de una persona, en donde se hace referencia a relaciones sexuales mutuamente monógamas, la reducción del número de parejas sexuales, así como en uso del condón”; recalca Abud.

Aunado a estos factores, se deben tomar en cuenta medidas que van relacionadas con la educación en medicina preventiva, para diagnósticos más oportunos y abordajes enfocados en reducir la morbilidad.

Los médicos ven también en la vacunación una de las medidas más acertadas que en definitiva reducen el desarrollo del virus, ya desde edades tempranas en las mujeres y hombres, antes del inicio de una vida sexual.

NOTAS RELACIONADAS

Niñas que quedaron sin vacuna contra el Papiloma Humano el año pasado, la recibirán este 2022

Viernes 04 febrero, 2022

Como parte de una estrategia mundial para la eliminación del Cáncer de Cérvix, la OMS recomienda que se vacune a las niñas de 9 años a 14 años, con dos dosis

¿Por qué la vacuna contra el papiloma humano se aplica a niñas?

Lunes 03 junio, 2019

El virus se transmite durante la relación sexual, aplicarla la vacuna antes del comienzo de relaciones será más eficaz dice la CCSS.

© **2023 Republica Media Group** todos los derechos reservados.