

La Teja

Regla se hizo un poco más intensa

Salud · Salud de la mujer · Medicina

26 jul. 2022 +1 más Rocío Sandí rocio.sandi@lateja.cr

De las mujeres que se han puesto la vacuna contra el covid-19, 42 de cada 100 experimentan sangrados menstruales más abundantes durante las dos semanas siguientes a la aplicación del medicamento.

Así lo revela un estudio liderado por las científicas Katharine Lee, de la Universidad de Tulane, y Kathryn Clancy, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que fue publicado en la revista Science Advances.

La investigación, que contó la participación de 39.129 mujeres, describe por primera vez la aparición de sangrado menstrual espontáneo después de la aplicación de la vacuna en un alto número de quienes no tenían la menstruación (porque tenían la menopausia o porque seguían un tratamiento hormonal anticonceptivo o para el cambio de género).

Las conclusiones confirman la ten-



Estos efectos son temporales y no tienen riesgo.

dencia de un efecto secundario que fue reportado por mujeres en varios países, pero hasta ahora se hizo un estudio específico.

Pero no hay de qué preocuparse, los

datos muestran que estas alteraciones son temporales, no son peligrosas y están asociadas a determinados factores desencadenantes como la edad, el padecimiento de efectos secundarios sistémicos asociados a

la vacuna (fiebre o fatiga), o el historial de embarazos y partos, entre otros.

Las investigadoras solo incluyeron los datos de las personas que no se habían enfermado de covid-19 (porque la enfermedad puede provocar cambios menstruales) y excluyeron los datos de las personas de entre 45 y 55 años para evitar que los resultados se confundieran con la menopausia o los cambios previos.

Escibe un comentario

Escuchar Ver página Compartir Guardar Más

