



Día Mundial de la Lucha contra el Sida

La mejora en la prevención de nuevas infecciones por VIH entre recién nacidos es uno de los mayores logros en la lucha contra el sida, ya que estos contagios se redujeron a la mitad entre 2005 y 2012.



Día Mundial de la Lucha contra el Sida



TAR
Tratamiento antirretroviral



ONUSIDA





unicef

Fuente: "La infancia y el sida: inventario de la situación en 2013"

Nuevos contagios por VIH

540.000

260.000



-48%



Hasta

850.000

nuevas infecciones por VIH entre niños (0-14 años) se evitaron en los países pobres, desde 2005

210.000

niños murieron debido a enfermedades relacionadas con el sida en 2012

TAR: niños vs adultos

El 100 % corresponde a las personas que requieren el tratamiento; cifras para 2012

Con TAR
Sin TAR

34 %



Niños

66 %


64 %



Adultos

36 %

"Opción B+", nuevo TAR



Es más eficaz en el tratamiento a mujeres con VIH y en la prevención de que transmitan el virus a sus bebés durante el embarazo, el parto o la lactancia

Lactantes infectados con VIH y sin TAR



1 de cada 3

moriría antes del 1er. año de vida



1 de cada 2

moriría antes de los 2 años de vida

