


## PAÍS REGISTRA 376 NUEVOS PACIENTES CON VIH



Reporte corresponde a los primeros seis meses de este año

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) sigue afectando la sociedad costarricense; solo en los primeros meses de este año se reportaron 376 nuevos casos de personas contagiadas.

De esa cifra, siete corresponden a menores de 18 años y 22 son mujeres embarazadas, además se registraron 17 nacimientos de madres VIH.

Los datos fueron emitidos por las siete clínicas de atención del VIH que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco del lanzamiento de la campaña "Activos pero Protegidos" de la CCSS.

La iniciativa busca crear conciencia entre la población sexualmente activa sobre los beneficios de detectar precozmente la infección, y la necesidad de hacerse una prueba cada año.

En el país en total 6.777 pacientes son atendidos en las clínicas de la caja, de los cuales 5.555 son hombres y 1.222 son mujeres. De ellos 4.883 tienen tratamiento antirretroviral.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema inmunitario y las destruye o trastorna su funcionamiento, lo que acarrea el deterioro progresivo de dicho sistema y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria.

La etapa más avanzada de la infección por el VIH representa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en instantes en los que se considera vital aclarar dudas que aún existen sobre la enfermedad, así como resaltar la prevención para evitar el contagio.

Uno de los primeros puntos que se

deben aclarar es que esta enfermedad no es de un solo grupo poblacional, sino que puede afectar a cualquier persona.

Otro mito está en la forma en que se

puede transmitir, pues para que ocurra, se requiere que haya contacto directo con sangre/secreciones con presencia del virus.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El VIH se puede transmitir por las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, por la transfusión de sangre contaminada, y por compartir agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes.
- La madre puede transmitirle la infección al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento.
- Si no se da tratamiento, la mayoría de los infectados por el VIH presentan signos de enfermedad al cabo de cinco a diez años, aunque el periodo puede ser más breve.
- Se puede limitar el riesgo de infectarse si cada vez que tiene relaciones sexuales se utiliza correctamente el condón masculino o femenino.